Variations des réserves corporelles chez les ovins : nouveau critère de sélection ?

Dominique HAZARD

UMR Génétique Physiologie et Systèmes d'Élevage (GenPhySE),
INRA Occitanie-Toulouse

SOMMAIRE

- ❖ 1. Intro-Contexte
- ❖ 2. Méthodes d'évaluation de l'état corporel
- ❖ 3. Relations avec d'autres caractères
- ❖ 5. Déterminisme génétique de l'état corporel
- ❖ 6. Aspect dynamique
- ❖ 7. Variabilité des trajectoires d'état corporel
- ❖ 8. Variabilité génétique des trajectoires
- ❖ 9. Perspectives de recherche

Introduction

Contexte

Ruminants :

- ❖ **Répondre aux nouveaux défis de l'élevage : produire plus, mieux et à moindre coûts**
 - Réduire l'utilisation des intrants
 - Renforcer l'utilisation des surfaces pastorales
 - Améliorer les réponses adaptatives aux aléas climatiques

Méthodes

Réserves corporelles stockées sous formes de lipides
= caractère difficile à mesurer

- réserves sous-cutanées (gras dorsal)
- réserves stockées dans cavité abdominale

❖ Mesure des réserves sous cutanées :

➤ Note d'état corporel (NEC) :

- palpation de la région lombaire
- évaluation subjective de l'état d'engraissement d'un animal vivant

échelle de 0 à 5 (unité=point; Jefferies, 1961)

échelle de 0 à 5 (unité=1/4 point; Russel et al., 1969)

Tableau 1 - **Echelle de notation de l'état corporel des brebis**
(d'après Russel et al 1969 - traduction : G. Molenat)

Note 0	Animal extrêmement émacié, "sur le point de mourir". Aucun tissu musculaire ou adipeux entre la peau et l'os.
Note 1	A - Apophyses épineuses saillantes et pointues. B - Apophyses transverses pointues. C - Les doigts passent facilement sous les apophyses transverses et il est possible de les engager entre elles. D - La noix est peu épaisse et concave. Pas de gras de couverture.
Note 2	A - Apophyses épineuses proéminentes sans rugosité. B - Apophyses transverses arrondies sans rugosité. C - Les doigts passent avec une légère pression sous les apophyses transverses, mais on ne peut les engager entre elles. D - La noix est moyennement épaisse, avec peu de gras de couverture.
Note 3	A - Les apophyses épineuses forment des ondulations souples. On peut les sentir individuellement en effectuant une légère pression. B - Apophyses transverses arrondies. C - Il faut exercer une pression moyenne pour engager les doigts sous les apophyses transverses. D - La noix est légèrement convexe avec une couverture de graisse moyenne.
Note 4	A - Les apophyses épineuses forment une ligne presque rectiligne. Une pression forte permet de les sentir individuellement. B - Même chose pour les apophyses transverses. C - Il est difficile d'engager les doigts sous les apophyses transverses. D - La noix est pleine et convexe avec une forte couverture adipeuse.
Note 5	A - Les apophyses épineuses ne peuvent être détectées. B - Les apophyses transverses ne peuvent être détectées. C - On ne peut pas engager les doigts sous les apophyses transverses. D - Les deux noix sont très convexes et on observe une dépression le long de la ligne médiane du dos entre les deux muscles. Il y a d'importants dépôts de graisse à la base de la queue.

Méthodes

❖ Mesure des réserves sous cutanées :

➤ **échographie dorsale :**

- épaisseur gras dorsal
- épaisseur muscle dorsal

gras
muscle

Brebis 1

Brebis 2

➤ **Imagerie tridimensionnelle**

- prises de vues, extraction de 4 points anatomiques du bassin
- en développement pour bovins (caprins)

Source : http://www.journees3r.fr/IMG/pdf/Texte_5_Elevage_de_precision_A-Fischer.pdf

Fischer et al., 2015)

Méthodes

- ❖ Mesure des réserves corporelles totales :
- tomographie à rayon X (CT scan, Imagerie 3D) :

- Mesurer les variations quantitatives de la composition corporelle *in vivo*
 - Masses musculaires
 - Masses adipeuses
 - Masses osseuses
- Echelle : tissus, organes

(Lambe NR, 2004)

- > outil utilisé en recherche et par les filières ovines :
- en Ecosse : programmes de sélection pour améliorer qualité de la viande et le taux de muscle (Charollais, Suffolk, et Texel)
 - en Nouvelle Zélande : améliorer les caractéristiques des tissus maigres de la carcasse

Méthodes

- ❖ Mesure des réserves corporelles totales :
- scanner à rayon X (DEXA, Imagerie 2D) :

Mesurer les variations quantitatives de la composition corporelle *in vivo*

- Masses musculaires
- Masses adipeuses
- Masses osseuses

- Echelle : zone corporelle

-> outil utilisé en recherche et par les filières ovines :

- en Australie : améliorer qualité de la carcasse (Hunter TE, 2011)

(Scholz AM, 2012)

Etat corporel et autres caractères

Etat corporel est associé à de nombreuses fonctions biologiques :

Etat corporel et reproduction

Reproduction		NEC (lutte)
Age puberté	retardé	↓
Taux ovulation	↑ (plateau)	↑ (optimum varie selon races)
Taux de conception	↑ Relation $\cap$	↑
Mortalité embryonnaire	↓ Relation U	↑
Prolificité	↑ Relation $\cap$	↑

NEC à lutte, mi-gestation :

positivement corrélé avec le nombre d'agneaux sevrés sous la mère

Pour revue: Kenyon et al, 2014

Etat corporel et production

	Production	NEC
Croissance fœtale, poids naissance	Études contradictoires (selon stade considéré). Relation positive avec NEC gestation	
Nombre agneaux nés	~ ou ↑ (Relation $\cap$)	↑
Survie des agneaux	~ ou ↑ (x2 : relation linéaire; x1, relation curvilinéaire)	↑
croissance agneaux	~ ou ↑ (plateau)	↑
lait	~ ou ↑	↑

Sources de variation

- ▶ Nombreux facteurs influencent l'état corporel

Physiologie

Stade physiologique
Rang de mise-bas
Age
Taille de la portée

Environnement

Alimentation
Systèmes
d'élevage/conduite
Météo/saison

Génétique

Races
Génotypes

Aspect dynamique des RC

❖ Variations de la NEC au cours d'un cycle de production

(ovins allaitants, conditions extensives: Romane La Fage)

➔ Variation des réserves corporelles selon les besoins énergétiques

Paramètres génétiques

❖ Note d'Etat Corporel :

- hérabilité = 0,10 – 0,37
- répétabilité : 0,20 – 0,41

Variations dues :

- stades physiologiques
- race
- conditions environnementales

(Borg et al 2005; Shackell et al, 2011; Everett-Hincks & Cullen; 2009; Macé et al, 2018)

❖ NEC & hérabilité selon stade physiologique

NEC	lutte	Gestation	Mise-bas	Allaitement	sevrage	Post-sevrage
lutte	0,35					
Gestation		0,37				
Mise-bas			0,26			
Allaitement				0,27		
Sevrage					0,33	
Post-sevrage						0,33

(ovins allaitants, conditions extensives)

(Macé et al 2018)

Paramètres génétiques

❖ **Corrélations entre les stades physiologiques : 0,71** (0,08) – **0,93** (0,04)

NEC	lutte	Gestation	Mise-bas	Allaitement	sevrage	Post-sevrage
lutte	-	0.93	0.82	0.75	0.82	0.92
Gestation	0.61	-	0.83	0.75	0.77	0.87
Mise-bas	0.41	0.41	-	0.90	0.84	0.77
Allaitement	0.35	0.36	0.63	-	0.90	0.71
Sevrage	0.38	0.37	0.48	0.58	-	0.82
Post-sevrage	0.45	0.45	0.47	0.51	0.58	-

(ovins allaitants,
conditions extensives)

(Macé et al, 2018)

❖ **Corrélations génétiques avec la survie des agneaux :**

- modérées à élevées : 0,39 – 0,73 (NEC mi-gestation et survie portée)

❖ **Nouvelle Zélande :**

index disponible pour la NEC (index à forte valeur économique)

Paramètres génétiques

❖ **Epaisseur de gras dorsal** (échographie)

- ovins allaitants

➤ héritabilités :

$h^2 = 0,08$ (Suffolk, *in vivo* au sevrage, engraissement au pâturage) (Maxa et al 2007)

$h^2 = 0,26$ (Blackface, *in vivo* au sevrage, conditions extensives) (Conington et al, 1995)

➤ Interaction Génotype x Environnement (G x E) :

$h^2 = 0,39$ (système extensif) vs $0,20$ (système intensif) (Blackface, age=20&17sem)

$r_G = 0,54$ ($\pm 0,17$) (intensif vs extensif) ($r_G = 0,70$ basse/haute montagne) (Bishop et al, 1996)

$r_G > 0,8$: pas d'interaction G x E (Scottish Blackface lambs, montagnes) (McLaren et al 2012)

Variabilité génétique

❖ **Masse adipeuse totale** (tomographie à rayon X)

➤ héritabilités :

$h^2 = 0,12-0,47$ (selon stades physio, Scottish Blackface adulte) (Lambe NR, 2004)

$h^2 = 0,27-0,85$ (gras interne)

$h^2 = 0,38-0,41$ (Charollais, Texel, Suffolk, *in vivo*) (Jones et al, 2004)

❖ **Variation de masse adipeuse** (CT scan)

$h^2 = 0,23$ (perte tissus adipeux total); $0,63$ (perte tissus adipeux interne)

$h^2 = < 0,12$ (gain tissus adipeux)

(Lambe NR, 2004)

Variabilité de la dynamique des RC

❖ Modalités des réponses dynamiques d'un système

➔ Peu d'étude sur la variabilité des trajectoires de la DRC (modalité de réponse, amplitude...)

Variabilité des trajectoires

❖ Note d'Etat Corporel :

(ovins allaitants, conditions extensives)

Multipares

Multipares, 2 agneaux

(Macé et al, 2018)

➔ Trajectoires diffèrent par les niveaux, mais aussi par les amplitudes de gain/perte d'état corporel

Répétabilité des trajectoires

❖ Note d'Etat Corporel :

NEC ajustée prenant en compte le niveau moyen d'état corporel sur la carrière

(Macé et al, 2018)

➔ Variations d'état corporel se répètent au cours des cycles de production

Variabilité génétique des trajectoires

Exemple d'approche : approche multicaractères
-> variation de NEC entre deux stades physiologiques

Paramètres génétiques des trajectoires

- ❖ **Amplitude de variation de la Note d'Etat Corporel**
- héritabilités et corrélations génétiques

Variation NEC	Gestation-sevrage	Mise-bas-allaitement	Après sevrage	Sevrage-lutte
Gestation-sevrage	0.14 (0.02)	0.49 (0.12)	-0.71 (0.08)	-0.73 (0.14)
Mise-bas-allaitement		0.07 (0.02)	-0.46 (0.12)	-0.52 (0.18)
Après sevrage			0.15 (0.02)	0.75 (0.10)
Sevrage-lutte				0.11 (0.04)

(Macé et al, 2018)

- Résultats corroborent 2 autres études

- Amplitude de variations de poids vif : héritabilité = 0,05 – 0,16
- Amplitude de variations de NEC : héritabilité = 0,02 – 0,06

(Rose et al, 2013;
Walkom et al, 2014)

Phénotypage des RC

- ❖ Biomarqueurs sanguins : métabolites et hormones clés du métabolisme des lipides

➤ **Métabolites** (2 exemples) :

- Acides Gras Non Estérifiés (AGNE): produits par la lipolyse des acides gras des tissus adipeux
- beta-hydroxy butyrate (β -OH): oxydation des acides gras

➤ **Hormones** (1 exemple) :

- **Leptine**: sécrétée par tissus adipeux lors de la lipogénèse (en grande quantité -> induit lipolyse)

Mobilisation RC	Accrétion RC
↑	↓
↑	↓
↓	↑

Phénotypage des RC

➤ Biomarqueurs sanguins : exemples AGNE et leptine

(Gonzalez et al, 2013;)

Perspectives de recherche

Innovation for Sustainable
Sheep and Goat
Production in Europe

WP5: Innovations génétiques pour améliorer la
robustesse des animaux
dont étude des RC comme phénotypes
d'adaptation

Objectifs pour RC :

- i) Caractériser les variations longitudinales des RC
- ii) Analyser la variabilité phénotypique et génétique
- iii) Rechercher des polymorphismes
- iv) Étudier les relations avec d'autres caractères (production, d'efficacité alimentaire...)

Phénotypes :

- métabolites/hormones
- Note état corporel
- Épaisseur gras et muscle dorsale

Manchega (Lait,
INIA-AGRAMA,
Espagne)

Romane (extensif,
INRA)

Lacaune (Lait, INRA)

Conclusions

- ❖ **Evaluation réserves corporelles : précision et/ou informativité de la mesure dépend de la méthode**
- ❖ **Réserves corporelles = « Outil » pour la conduite des animaux,**
- ❖ **Réserves corporelles = « Caractère » pertinent pour :**
 - ↳ mieux maîtriser/ améliorer diverses fonctions/caractères/réponses
- ❖ **Déterminisme génétique :**
 - ↳ niveau des RC à un stade physiologique donné = héritable
 - ↳ amplitude de variation des RC = héritable
- ❖ **Travaux de recherche à poursuivre :**
 - ↳ Proposer d'autres méthodes de phénotypage (biomarqueurs...)
 - ↳ Déterminisme génétique (G x E, QTL, ...)

Remerciements

- ❖ SELMET (INRA SupAgro Montpellier):
Eliel GONZALEZ-GARCIA *et al.*
- ❖ UE La Fage (INRA, Roquefort sur Souzou):
Sara PARISOT, Julien PRADELLES, Sébastien Douls,
Fabien CARRIERE, Didier FOULQUIE

Oloron-Sainte-Marie

Semaine Européenne des Races locales des Massifs

« PASTORALISME & RACES LOCALES »

16-17-18 septembre 2018

Merci pour votre attention